



Validation québécoise d'un outil de dépistage de la violence chez des couples masculins de même sexe : formes, prévalence et patrons

Martin Blais | Sébastien Béland | Natacha Godbout | Joanne Otis | Ken Monteith
& l'Équipe de recherche et la coalition intersectorielle du projet MOBILISE!





Chercheur.e.s principaux | Ken Monteith, COCQ-SIDA; Joanne Otis, UQAM


Co-chercheur.e.s et utilisateurs de connaissances | Marianne Beaulieu, Line Chamberland, Jorge Flores Aranda, Aurélie Hot, Gabriel Girard, Bruno Laprade, Bertrand Lebouché, Alain Léobon, David Lessard, Sarah Mathieu-Chartier, Maria Mensah, Pierre-Henri Minot, Roberto Ortiz, David Thompson, Cécile Tremblay

Personnel | Thomas Haig, UQAM/COCQ-SIDA; Jessica Caruso, UQAM; Ludivine Veillette-Bourbeau, UQAM; Patrice Bécotte, RÉZO; Frédérick Pronovost, RÉZO; Alexandre Dumont-Blais, RÉZO; Jacynth Betts, UQAM; Gabriel Daunais-Laurin, UQAM; Gabriel Giroux, RÉZO

Partenaires | COCQ-SIDA; Department of sexology, UQAM; RÉZO; ACCM; Chaire de recherche sur l'homophobie, UQAM; CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal; Clinique médicale L'Actuel; Clinique médical OPUS; Clinique médicale du Quartier Latin; Direction de la santé publique de Montréal-Centre; *Fugues*; Institut thoracique de Montréal; Maison Plein Cœur; Ministère de la santé et des services sociaux du Québec; Portail VIH/sida du Québec; Warning Montréal

Partenaires financiers | Canadian Institutes of Health Research (CIHR); Réseau Sida et maladies infectieuses du Fonds de recherche du Québec — Santé (FRQS); CIHR Centre for REACH in HIV/AIDS (REACH 2.0); Positive Action Canada Innovation Program, ViiV Healthcare

Contexte



- 1/3 à 1/2 gbHSH, peu importe leur orientation sexuelle*, rapporte avoir vécu de la violence dans leur relation intime (VRI; Bacchus et al., 2017; Duncan et al., 2016; Li, Baker, Korostyshevskiy, Slack, & Plankey, 2012; Stephenson & Finneran, 2017).
 - avoir à demander la permission du partenaire
 - avoir peur
 - être physiquement blessé
 - être forcé à avoir des rapports sexuels

* Les hommes ayant des relations avec d'autres hommes se décrivent de différentes manières qui ne recourent pas nécessairement le sexe ou le genre de leurs partenaires : gai, homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, pansexuel, etc.

Des mesures (in)adaptées de VRI



Les hommes gbHSH sont exposés dans leurs relations intimes non seulement aux formes usuelles de VRI, mais aussi à des formes spécifiques, notamment




- menaces de divulgation...
de l'orientation sexuelle (notamment chez les hommes bisexuels)
du sexe assigné à la naissance (chez les hommes trans)



- prophylactiques
non-usage/retrait du condom durant les rapports sexuels
exposition non consentie à des risques d'infection par le VIH

Objectifs



Décrire les **formes** de violence intime, leur **prévalence** et leurs **patrons** chez des hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec hommes (gbHSH)




Étude corrélationnelle



Ciblant les gbHSH + 18 ans et plus + fréquentant des services sociaux et de santé à Montréal




Recrutement en ligne, de mai 2016 à janvier 2017
1028 répondants; 714 (70 %) sans données manquantes



Sous-échantillon : $n = 556$ gbHSH ayant été en couple au cours des 12 mois précédant l'enquête

Violence dans les relations intimes (adaptée de Stephenson et al., 2013)



**Dans les 12 derniers mois, avez-vous rencontré les situations suivantes avec un partenaire de couple?
Cochez tout ce qui s'applique...**


Physique	dispute qui a dégénéré d'une des façons suivantes: destruction de biens, agripper, restreindre, pousser, donner un coup de pied ou de poing, gifler, menacer ou intimider physiquement
Sexuelle	subir de la pression ou être forcé à faire un acte sexuel non désiré (par ex. sexe oral ou anal, avec des relations sexuelles avec d'autres personnes)
Négociation du condom	pression pour avoir une relation sexuelle sans condom, même si le condom a été demandé
Émotionnelle	insulter, critiquer, menacer ou crier (par ex. critiquer les performances sexuelles ou les vêtements, menacer de dévoiler l'orientation sexuelle)
Contrôle, surveillance	empêcher de communiquer ou de voir les amis, la famille, les collègues / surveiller ou exiger l'accès au cellulaire, courriels, réseaux sociaux, finances, etc.
Menace	avoir peur, se sentir menacé, isolé ou emprisonné dans la relation / des amis ou membre de la famille ont soulevé des préoccupations concernant votre sécurité ou la sécurité de votre partenaire dans la relation




Analyses



Estimations de prévalence (IC 95 %)



Tableaux croisés



Analyses de classes latentes



Caractéristiques des répondants (n=556)

Âge		$M = 39,5$ ($É-T = 13,1$)
Scolarité (\geq université)		59,5 %
Gai/homosexuel		86,7 % (bi : 7,9 %)
En couple		55,3 %
Ethnicité (Blancs)		88,1 %
VIH+		15,1 % (95 % charge virale indétectable)
VIH?		9,4 %
Lieu de résidence		Montréal 77.3% Québec 4.0% Autre 18,7 %





VRI dans l'échantillon total (n=556)



🔴 Négociation du
condom

🟠 Menace

🟡 Physique



🟡 Émotionnelle


🟢 Sexuelle

🟠 Contrôle

VRI, au moins une forme, 12 derniers mois (n=556)



Au moins une
forme



Aucune forme
déclarée

VRI, parmi les victimes (n=141)



● Négociation du
condom

● Menace

● Physique

43,3 %

33,3 %

22,0 %

34,8 %

29,1 %

22,0 %

● Émotionnelle

● Sexuelle


● Contrôle



Caractéristiques des hommes gbHSH ayant vécu de la VRI dans les 12 derniers mois (n=556)


	Sexuelle	Négociation du condom	Émotionnelle	“Oui” à au moins une des formes
Âge (%)				
18-24	15.15*	16.67	18.18*	37.88*
25-34	9.94	13.45	11.70	31.58*
35+	4.39*	8.46	5.33*	19.44*
Ethnicité				
Blancs	6.95	10.63	8.79	25.56
Latinos	3.23	6.45	3.23	6.45*
Autre	14.29	17.14	11.43	37.14
Sexual Orientation				
Gai/homosexuel	5.60*	9.75*	8.30	24.07
Bisexuel	4.55	9.09	4.55	20.45
Autre	40.00*	33.33*	23.33*	53.33*
Statut sérologique				
VIH-	6.67	10.00	9.76	19.1
VIH+	8.33	7.14	7.14	17.7

Trois patrons de VRI chez les hommes gbHSH






Trois patrons de VRI chez les hommes gbHSH






Trois patrons de VRI chez les hommes gbHSH







Trois patrons de VRI chez les hommes gbHSH




Trois patrons de VRI chez les hommes gbHSH




Constats (1)



- Environ 26 % [22-29 %] des cas d'hommes gbMSM ont rapporté de la violence dans leurs relations intimes au cours de l'année précédant la collecte de données
 - la forme la plus fréquente (43 %) concerne les pressions pour ne pas utiliser le condom même après l'avoir demandé.
- Les **plus jeunes** (18-24 ans) sont les plus touchés par la VRI, ainsi que les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes qui se définissent **autrement que comme gais, homosexuels ou bisexuels** (p. ex. *queer*, pansexuels, en questionnement, hétérosexuels)



Constats (2)



- Trois profils distincts de VRI chez les hommes gbHSH
 - une majorité (83 %) vivant peu de VRI
- deux sous-groupes
 - poly-VRI (8 %), avec dominante émotionnelle, avec contrôle, surveillance et menaces
 - VRI à dominante sexuelle et négociation du condom (8 %)

Limites



- Étude transversale et corrélationnelle
- Données autorapportées, sujettes à des biais de mémoire et de désirabilité sociale
- Échantillon de taille limitée

Facteurs spécifiquement associés à la VRI dans les couples de même sexe/genre



Homophobie intériorisée, honte

Dissimulation de l'OS/IG



Faible soutien social et isolement

Peur de demander de l'aide



Peu de modèles de survivants

Absence de services spécialisés pour les hommes en couple de même sexe/genre



Un seul service spécialisé en VRI pour les couples de même sexe/genre... féminin


Pistes pour l'intervention



- former et responsabiliser les professionnel.le.s (intervenant.e.s, les pair.e.s-aidant.e.s) pour développer un niveau de compétence suffisant pour travailler avec les hommes gbHSH



- accroître la sensibilisation à la VRI chez les hommes gbHSH eux-mêmes



- soutenir et outiller les hommes gbHSH dans des relations violentes



- soutenir les initiatives existantes dans les organisations communautaires ou les soutenir pour créer de telles initiatives